

Bulletin d'information



CULTURES EN SERRES
No 15 – 21 novembre 2012

CALENDRIERS DE FORÇAGE EN SERRE DE L'HYDRANGÉE, DU LYS DE PÂQUES ET DU ROSIER POUR 2013

Pour l'année 2013, la fête de Pâques est hâtive, soit le 31 mars. Après la vente des potées destinées à la fête de Pâques, de l'espace en serre sera disponible à la fin du mois de mars pour les cultures annuelles commercialisées vers la mi-mai. Les tableaux présentés dans les pages suivantes donnent un aperçu des dates de la synchronisation de la production de l'hydrangée, du lys de Pâques et du rosier pour les fêtes des Mères et de Pâques en 2013. De plus, consultez les courbes de croissance du lys de Pâques dans le présent document afin d'obtenir un lys de 16 pouces (40 cm) de hauteur en **excluant celle du pot**. Ces courbes vous serviront de guide pour déterminer la hauteur désirée de votre produit à la vente.

BONNE PRODUCTION EN 2013!

Texte rédigé par :

Michel Senécal, agronome, conseiller en serriculture, Direction régionale de Montréal–Laval–Lanaudière, MAPAQ

ANDRÉ CARRIER, agronome
Avertisseur – légumes de serre
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ
675, route Cameron – bur. 100
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7
Tél. : 418 386-8116, poste 1517 – Téléc. : 418 386-8345
Courriel : andre.carrier@mapaq.gouv.qc.ca

MICHEL SENÉCAL, agronome
Avertisseur – floriculture en serre
Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ
867, boulevard de l'Ange-Gardien – 1^{er} étage – bur. 1.01
L'Assomption (Québec) J5W 4M9
Tél. : 450 589-5781, poste 5033 – Téléc. : 450 589-7812
Courriel : michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Bruno Gosselin, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© **Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document**
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Bulletin d'information No 15 – cultures en serres – 21 novembre 2012



CALENDRIER DE FORÇAGE DE L'HYDRANGÉE POUR PÂQUES ET LA FÊTE DES MÈRES EN 2013¹

<i>Stade de développement</i>	<i>Pâques²</i> <i>102 jours</i>	<i>Fête des Mères²</i> <i>92 jours</i>
Début du forçage en serre	19 décembre 2012	8 février 2013
Débourrement	26 décembre 2012	15 février 2013
Feuilles ouvertes		
1-2 paires	3 janvier 2013	22 février 2013
4 paires	10 janvier 2013	1 ^{er} mars 2013
5-6 paires	27 janvier 2013	8 mars 2013
Bouton floral		
0,5 cm	24 janvier 2013	14 mars 2013
1,5 cm	31 janvier 2013	20 mars 2013
2,0 cm	7 février 2013	26 mars 2013
3,0 cm	14 février 2013	1 ^{er} avril 2013
4,0 cm	21 février 2013	7 avril 2013
Début de l'expansion et coloration des bractées	1 ^{er} mars 2013	13 avril 2013
Bractées colorées et endurcissement à 13 °C	15 mars 2013	27 avril 2013
Début des ventes	22 mars 2013	3 mai 2013
Pâques ou fête des Mères	31 mars 2013	12 mai 2013

1. En pots de 16,5 à 18 cm sous une température nocturne de 16-17 °C.

2. Pour un cultivar de hâtivité moyenne (« Merrit Suprême », « Firelight »). Pour un cultivar un peu plus tardif (« Mathilda Gutges »), ajouter 5 jours et pour un cultivar hâtif (« Todi »), retrancher environ 5 jours. Consultez votre fournisseur pour les propositions de cultivars nouveaux.




CALENDRIER DE FORÇAGE DU LYS DE PÂQUES POUR 2013 POUR DES LYS VERNALISÉS (PRÉREFROIDIS) EN CAISSES

<i>Stade de développement</i>	<i>Date</i>	<i>Remarques</i>
Empotage des bulbes	29-30 novembre 2012	Température de sol de 18-20 °C.
Formation des racines	14 décembre 2012	Baisser la température à 17 °C quand 25 % des plants émergent du sol.
Émergence	21 décembre 2012	Début de la fertilisation.
Tiges 2-5 cm	29 décembre 2012	Débuter les applications de A-REST ou de SUMAGIC lorsque la tige a 7 cm de hauteur. Traitements de sol avec des fongicides à tous les mois.
Tiges 5-8 cm	6 janvier 2013	Formation des boutons floraux.
Tiges 10-14 cm	16-18 janvier 2013	Température de l'air de 16 °C la nuit et 21 °C le jour**. Donner l'espacement final.
Tiges 14-17 cm	27 janvier 2013	Classer les lys par hauteur. Traitements de sol avec des fongicides.
Présence de boutons	10 février 2013	Application de FASCINATION. Les lys floraux au toucher approchent la moitié de leur hauteur finale.
Boutons visibles dans le feuillage	18 février 2013	35 jours jusqu'aux ventes (25 mars).
Boutons 1,0-2,5 cm	25 février 2013	Application de FASCINATION si nécessaire.
Boutons 2,5-4,0 cm	4 mars 2013	
Boutons 4,0-5,0 cm	10 mars 2013	
Boutons 5,0-10,0 cm	18 mars 2013	Entreposage entre 2 et 7 °C si nécessaire.
Début de la floraison et des ventes	25 mars 2013	
Pâques	31 mars 2013	

****** Dans la période d'élongation rapide de la tige (16-18 janvier au 25 février), une température de jour/nuit égale ou un refroidissement des serres tôt le matin donnera des plants plus courts (effet DIF). Attention : cette méthode avec du SUMAGIC peut donner des plants très courts. Suivez les courbes de croissance dans le présent bulletin d'information.



Courbes de croissance hebdomadaires maximales et minimales du lys de Pâques pour obtenir une hauteur moyenne de tige de 40 cm à la vente (Tiré de McAvoy, 2012)



CALENDRIER DE FORÇAGE DU ROSIER EN POTS POUR 2013¹

Stade de développement	Pâques	Fête des Mères	Température de l'air
<i>Plantation</i>	9 au 16 janvier 2013	4 au 11 mars 2013	12-13 °C
<i>Débourrement</i>	24 au 31 janvier 2013	18 au 25 mars 2013	17-18 °C
<i>Bouton « petit pois »</i>	1 ^{er} au 5 mars 2013	12 au 16 avril 2013	18 °C
<i>Début des ventes</i>	25 mars 2013	6 mai 2013	13-15 °C
<i>Pâques ou fête des Mères</i>	31 mars 2013	12 mai 2013	

1. Pour des rosiers pincés, avancer la date de plantation d'environ un mois et effectuer le pinçage 7-8 semaines avant Pâques ou 6-7 semaines avant la fête des Mères.

Les rosiers tardifs (type « Garnet ») doivent être plantés en premier, suivi des mi-hâtifs (type « Mother Days ») et en dernier lieu des hâtifs. Pour les autres cultivars, consultez votre fournisseur pour connaître les temps de forçage. Les rosiers cirés ne nécessitent généralement pas de nébulisation à la suite de la plantation.

