



- Apparition de la mouche de la pomme.

APPARITION DE LA MOUCHE DE LA POMME

État de la situation

Les premières captures de mouche de la pomme ont été enregistrées cette semaine dans trois vergers du sud du Québec (en Montérégie-Est et dans le sud-ouest de Montréal).

Stratégies d'intervention (rappel)

- Installez vos pièges et commencez le dépistage dès maintenant, si ce n'est déjà fait.
- Ne confondez pas la mouche de la pomme avec des espèces d'apparence semblable.
- Seuils d'intervention : 2 mouches/sphère rouge pour un premier traitement dans les situations typiques, mais le seuil peut varier de 1 à 5 mouches sous certaines conditions.

Pour les détails, vous pouvez consulter la [fiche 77](#) du Guide de référence en production fruitière intégrée (Guide de PFI) et l'[avertissement N° 11](#) du 17 juin 2015.

LE RÉSEAU DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE POMICOLE EN
PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE (RÉSEAU-POMMIER)
GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste – Avertisseur
VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste – Coavertisseur
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
Courriel : info@irda.qc.ca

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome, et Cindy Ouellet, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 12 – Pommier – 26 juin 2015