



Petits fruits

Avertissement N° 16 – 7 août 2015

- [Drosophile à ailes tachetées](#).
- [Fraises](#) : puceron du fraisier ailé et aleurode des serres.
- [Framboises d'été plein champ](#) : taille après la récolte.
- [Résultat du dépistage de la drosophile à ailes tachetées](#).

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES

Les captures se poursuivent dans plusieurs régions du Québec ([annexe 1](#)). Le seuil de 10 captures hebdomadaires a été atteint dans les régions de l'Estrie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le dépistage par le Réseau d'avertissements phytosanitaires dans ces régions se termine donc officiellement cette semaine. Des dommages aux fruits ont été rapportés par nos collaborateurs dans une framboisière située dans la région de Lanaudière. N'hésitez pas à consulter votre conseiller afin d'évaluer le risque pour vos cultures. [Pour en savoir plus](#).

FRAISES

Puceron du fraisier ailé : Cette semaine, nous avons observé des pucerons du fraisier ailés dans les sites témoin des Laurentides, de la Montérégie-Ouest, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour éviter la transmission des virus d'un champ infecté vers les champs en implantation, il faut intervenir sur la forme ailée du puceron, car c'est cette dernière qui transporte les virus.

Aleurode des serres : Cette semaine, nous avons observé des aleurodes des serres dans les sites témoins de la Montérégie-Ouest, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, de l'Estrie, du Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cliquer [pour en savoir plus](#) sur ces deux insectes vecteurs de virus dans le fraisier (le puceron du fraisier ailé et l'aleurode des serres).

FRAMBOISES D'ÉTÉ PLEIN CHAMP

Taille après la récolte : La récolte des framboises tire à sa fin et il est déjà temps de penser à la production de 2016. La taille permet de réduire la compétition, de favoriser la croissance des tiges et d'améliorer l'état phytosanitaire de la framboisière.

Vous pouvez tailler aussitôt la récolte terminée si :

- Vos vieilles cannes sont atteintes d'antracnose ou de brûlure des dards.
- La présence de tétranyques est élevée et qu'il y a peu de prédateurs.
- Vous avez observé de la brûlure bactérienne cette année.
- Vous avez eu des pertes par la rouille jaune tardive.
- Votre densité de cannes fruitières dépasse 20 cannes au mètre linéaire.

Dans le cas contraire, vous pourriez tenter l'expérience d'une taille tardive sur une portion de votre champ.

[Pour en savoir plus.](#)

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur Sections bleuet et drosophile Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca	STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseuse Section fraise Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca
GUY-ANNE LANDRY, agronome – Coavertisseuse Section framboise Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ Téléphone : 819 371-6761, poste 4608 Courriel : guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca	

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome, et Marie-France Asselin, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 16 – Petits fruits – 7 août 2015

Annexe 1 : Dépistage de la **drosophile à ailes tachetées (DAT)**

Réseau de piégeage du Réseau d'avertissements phytosanitaires petits fruits

N° kit de piégeage	Région administrative et MRC	Décompte hebdomadaire de DAT dans les pièges			Semaines cumulatives avec captures	Présence de larves ¹	Date de fin de piégeage ²
		19 au 25 juillet	26 juillet au 1 ^{er} août	2 au 8 août			
1	Montérégie-Est Rouville	4 (fraise)	1 (framboise)	3 (framboise)	3	N	-
2	Montérégie-Ouest Beauharnois-Salaberry	1 (framboise)	1 (framboise)	-	3	ND	-
3	Montérégie-Ouest Brome-Missisquoi	1 (fraise)	5 (fraise)	-	2	ND	-
31	Montérégie-Ouest Le Haut-Saint-Laurent	1 (bleuet)	0 (bleuet)	-	1	ND	-
4	Montérégie-Est Le Haut-Richelieu	2 (bleuet)	2 (bleuet)	-	2	ND	-
5	Outaouais Les Collines-de-l'Outaouais	0 (fraise)	0 (fraise)	0 (fraise)	0	ND	-
6	Laurentides Deux-Montagnes	1 (framboise)	1 (framboise)	3 (framboise)	3	ND	-
7	Laurentides Mirabel	1 (fraise)	0 (framboise)	1 (framboise)	2	ND	-
8	Montréal-Laval-Lanaudière Laval	3 (framboise)	10 (framboise)	-	2	N	28 juillet
9	Montréal-Laval-Lanaudière D'Autray	1 (framboise)	0 (framboise)	1 (framboise)	2	O	-
10	Mauricie Trois-Rivières	1 (framboise)	0 (framboise)	-	1	ND	-
11	Estrie Coaticook	1 (framboise)	6 (framboise)	16 (framboise)	3	N	4 août
12	Centre-du-Québec Nicolet-Yamaska	-	0 (fraise)	0 (fraise)	0	ND	-
13	Centre-du-Québec Arthabaska	0 (fraise)	0 (bleuet)	1 (bleuet)	1	ND	-
14	Capitale-Nationale La Côte-de-Beaupré	0 (framboise)	0 (framboise)	0 (framboise)	0	N	-
15	Capitale-Nationale L'Île d'Orléans	0 (framboise)	0 (framboise)	1 (framboise)	1	N	-
16	Chaudière-Appalaches Lévis	3 (framboise)	0 (framboise)	5 (framboise)	2	ND	-
17	Chaudière-Appalaches Beauce-Sartigan	1 (framboise)	3 (framboise)	-	2	N	-
18	Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup	0 (fraise)	0 (framboise)	1 (framboise)	1	N	-
19	Saguenay-Lac-Saint-Jean Le Domaine-du-Roy	1 (fraise)	11 (fraise, framboise)	-	2	N	4 août
20	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Avignon	0 (fraise)	0 (framboise)	1 (framboise)	1	N	-

1 : O : Oui N : Non ND : Non disponible

2 : Pour chacun des sites, le piégeage se termine lorsque le nombre de 10 captures hebdomadaires est atteint.

3 : Un ou plusieurs adultes de la drosophile à ailes tachetées ont été capturés par l'un de nos collaborateurs dans cette région. Le piège positif ne fait pas partie du réseau de piégeage du RAP.