



Ferme Bordelo Inc.

Mélanie Brouillard

Saint-David, Montérégie-Est

Laitier et Grandes cultures

Semis direct



- Mise en contexte

- Ferme laitière
- Région 2800 utm
- Types de sol : loam sableux, un peu de sable et d'argile
- 170 ha
- Cultures : foin, maïs, maïs ensilage, soya, haricot, seigle.



-L'haricot cranberry est idéal en semis direct dans un couvert de seigle roulé à cause de sa date de semis du 10 au 20 juin après la pollinisation du seigle.

-Donc il faut se préparer l'automne précédant en implantant un seigle d'automne et en voulant un bon couvert dense au printemps.



Une photo vaut mille mots!!



Pollinisation





JOURNÉE CULTURES DE COUVERTURE 2017





JOURNÉE CULTURES DE COUVERTURE 2017





JOURNEE CULTURES DE COUVERTURE 2017





JOURNÉE CULTURES DE COUVERTURE 2017



Date de semis 16 juin





26 juin





4 juillet





JOURNEE CULTURES DE COUVERTURE 2017



11 juillet





JOURNÉE CULTURES DE COUVERTURE 2017



23 juillet





31 juillet





16 septembre





Andainage et battage





25 septembre



JOURNÉE CULTURES DE COUVERTURE 2017



AVANTAGES

- Pas de fongicide (pas toujours efficace et dispendieux)
- Pas d'herbicide
- Souffre moins de manque d'eau
- Moins de variabilité dans le rendement



INCONVENIENT

- Bonne survie à l'hiver du seigle



Données techniques

- taux semis du seigle : 200 kg/ha
- date de semis haricot : mois de juin
- taux semis haricot : 60 à 65 000 gr/acre
- rendement visé : 1 tm/ac
- prix/tm : 1050 \$ à 1300 \$/tm
- peu exigeant en engrais



MERCI